



NEWSLETTER

No ambulatório da ARS Norte, os antibióticos representam em embalagens dispensadas, mais de 81% dos medicamentos anti-infecciosos e cerca de 4,8% do total de medicamentos. Em encargo para o SNS, representam 78% dos medicamentos anti-infecciosos e cerca de 3 % da faturação do total de medicamentos no ambulatório.



COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

Monitorização do consumo de antibióticos no ambulatório da ARSN 2013-2015

Os dados referem-se à dispensa de antibióticos em farmácia comunitária, no período de 2013-2015, assumindo-se que a dispensa corresponde ao consumo.

Consideraram-se para a análise do consumo total de antibióticos (J01) por local de prescrição no ambulatório da ARS Norte: Cuidados de Saúde Primários (CSP), Hospitais Públicos, Hospitais Privados e Outros Locais Privados (consultórios, clínicas /sociedades) por representarem cerca 91% do volume de antibióticos faturados.

A análise dos antibióticos (J01) no ambulatório ARSN, exclui os antituberculosos e antileproticos.

Nº de embalagens dispensadas e encargos SNS (€) de anti-infecciosos e antibióticos no ambulatório da ARSN

ARS Norte								
Anos	Embalagens dispensadas (Nº)				Encargo SNS (€)			
	Total GFT (Anti-Infeciosos)	Δ% (2013-2015)	Antibióticos	Δ% (2013-2015)	Total GFT (Anti-Infeciosos)	Δ% (2013-2015)	Antibióticos	Δ% (2013-2015)
2013	2.999.371		5,97%		2.443.957		6,51%	
2014	3.060.658	2.492.537		15.690.941	12.289.685			
2015	3.178.331	2.603.370		15.491.758	11.989.368			

Verifica-se um aumento de 6,51% no número de embalagens dispensadas, com um decréscimo de 2,81% no encargo do SNS.

Consumo de antibióticos (nº embalagens) por local de prescrição no ambulatório da ARSN

Tipo de local	2013		2014		2015		Δ% Nº emb (2013-2015)	Δ% p.p Genéricos (2013-2015))
	Nº emb	% Genéricos	Nº emb	% Genéricos	Nº emb	% Genéricos		
CSP	960.900	50,60%	893.322	49,05%	919.180	50,17%	-4,34%	-0,43
Hospitais Privados	157.598	40,08%	204.067	37,16%	248.491	37,67%	57,67%	-2,41
Hospitais Públicos	629.556	54,70%	641.565	50,75%	614.027	49,72%	-2,47%	-4,98
Outros Locais Privados	472.780	45,31%	524.501	42,90%	582.696	43,20%	23,25%	-2,11
Restantes locais	221.910	48,52%	227.599	47,24%	237.369	49,46%	6,97%	0,94
Total ARS Norte	2.442.744	49,77%	2.491.054	47,05%	2.601.763	47,24%	6,51%	-2,53

Constata-se no entanto um decréscimo de 4,34% de embalagens dispensadas nos CSP, bem como uma cota de genéricos superior à cota global de medicamentos genéricos na ARSN.

[Ver mais](#)



NEWSLETTER COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

Monitorização do consumo de antibióticos no ambulatório ARSN 2013-2015

Consumo de antibióticos por classe (nº embalagens) e dose diária definida/mil habitantes/dia (DHD) no ambulatório da ARSN

Classe terapêutica	2013		2014		2015		Δ% DHD (2013-2015)	2014 Portugal (DHD) ¹	2015 Portugal (DHD) ¹
	Nº emb. Disp	DHD	Nº emb. Disp	DHD	Nº emb. Disp	DHD			
Beta_lactamicos, Penicilinas Associações de penicilinas com inibidores das lactamases beta (J01C)	1.157.021	9,88	1.189.190	10,46	1.215.533	11,17	13,06%	11,61	12,2
Outros Beta -lactamicos (J01D) Cefalosporinas*	212.951	0,90	208.655	0,77	221.605	0,96	6,67%	1,44	1,56
Tetraciclina (J01A)	58.600	0,65	65.648	0,74	67.447	0,76	16,92%	0,83	0,83
Macrólidos (J01F)	469.853	2,31	484.758	2,38	545.807	2,67	15,58%	2,79	3,06
Quinolonas (J01M)	305.037	1,83	294.093	1,77	288.754	1,73	-5,46%	2,12	2,05
Sulfonamidas e trimetoprim (J01E)	78.376	0,33	77.272	0,31	74.712	0,31	-6,06%	0,44	0,43
Outros antibacterianos (J01)	160.906	0,28	171.438	0,3	187.905	0,32	14,29%	1,1	1,14
Total (J01)	2.442.744	16,10	2.491.054	16,66	2.601.763	17,92	11,30%	20,31	21,27

Verificou-se um aumento da dispensa de antibióticos de 11,30%, em DHD, entre 2013 e 2015. No entanto nos anos 2014 e 2015 os valores são inferiores à média nacional. As penicilinas foram os antibióticos mais frequentemente prescritos. Verifica-se ainda um aumento no consumo dos macrólidos e um decréscimo no consumo das quinolonas.

Consumo de antibióticos por classe (nº embalagens) e dose diária definida/mil habitantes/dia (DHD) nos CSP

Classe terapêutica	2013		2014		2015		Δ% DHD (2013-2015)
	Nº emb. Disp	DHD	Nº emb. Disp	DHD	Nº emb. Disp	DHD	
Beta_lactamicos, Penicilinas Associações de penicilinas com inibidores das lactamases beta (J01C)	468.401	3,32	443.599	3,21	446.653	3,6	8,43%
Outros Beta -lactamicos (J01D) Cefalosporinas*	70.097	0,29	58.689	0,25	61.427	0,27	-6,90%
Tetraciclina (J01A)	16.848	0,12	16.364	0,12	15.461	0,11	-8,33%
Macrólidos (J01F)	189.447	0,93	170.860	0,85	192.209	1,00	7,53%
Quinolonas (J01M)	96.274	0,56	83.657	0,48	77.721	0,46	-17,86%
Sulfonamidas e trimetoprim (J01E)	28.925	0,23	25.922	0,20	24.258	0,19	-17,39%
Outros antibacterianos (J01)	90.908	0,14	94.231	0,15	101.451	0,16	14,29%
Total CSP (J01)	960.900	5,59	893.322	5,26	919.180	5,78	3,40%

Especificamente verifica-se nos CSP uma redução significativa das Quinolonas, Sulfonamidas, Tetraciclina e Cefalosporinas, respetivamente de 17,86%, 17,39%, 8,33% e 6,90% e um aumento no consumo de Penicilinas, de Macrólidos e de outros antibacterianos respetivamente de 8,43%, 7,53% e de 14,29%.

*Neste grupo contabilizou-se o nº embalagens de monobactamicos (J01DF O1) que representam respetivamente por ano 0,83%, 0,82% e 0,77%

¹ Fonte: ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) – 2014 e 2015

Nota: Dados ARSN extraídos do SIARS-Hierarquia dos Locais 2015 em 18-11-2016

